

Les nombres romains

I	1	...	
II	2	XXX	30
...		...	
IV	4	XL	40
V	5	...	
VI	6	L	50
...		...	
IX	9	XC	90
X	10	...	
XI	11	XCIX	99
...		C	100
XIV	14	...	
XV	15	CD	400
XVI	16	D	500
...		...	
XIX	19	CMXCIX	999
XX	20	M	1 000

Règle de construction des nombres romains

V = 5

$$VI = 5 + 1 = 6$$

⇒ le **I**, placé **après** le V est compris comme **ajouté**

$$IV = -1 + 5 = 4$$

⇒ le **I**, placé **avant** le V est compris comme **retiré**

X = 10

$$XI = 10 + 1 = 11$$

⇒ le **I**, placé **après** le X est compris comme **ajouté**

$$IX = -1 + 10 = 9$$

⇒ le **I**, placé **avant** le X est compris comme **retiré**

L = 50

$$LX = 50 + 10 = 60$$

⇒ le **X**, placé **après** le L est compris comme **ajouté**

$$XL = -10 + 50 = 40$$

⇒ le **X**, placé **avant** le L est compris comme **retiré**

C = 100

$$CX = 100 + 10 = 110$$

⇒ le **X**, placé **après** le C est compris comme **ajouté**

$$XC = -10 + 100 = 90$$

⇒ le **X**, placé **avant** le C est compris comme **retiré**

La valeur d'un symbole ne peut être **soustraite** que si elle est **plus petite** que celle du symbole qui suit.